



Situation Epidémiologique de la Tuberculose au Maroc – Année 2015

Situation épidémiologique dans le monde

Selon les données de l'Organisation Mondiale de la Santé en 2014, 9,6 millions de personnes ont développé la tuberculose (TB), 1,5 million en sont mortes et près de 480 000 personnes ont développé une tuberculose multirésistante (TB-MR).

Bien que son taux de mortalité ait chuté de 47% entre 1990 et 2015, la tuberculose demeure une des maladies les plus meurtrières au monde après le VIH/sida. Plus de 95% des décès se produisent dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

L'objectif du Millénaire pour le développement, préconisant d'avoir maîtrisé l'épidémie de tuberculose et inversé la tendance avant 2015, a été atteint. L'incidence de la tuberculose a baissé en moyenne de 1,5% par an depuis l'an 2000, soit une diminution totale de 18%.

On estime que près de 43 millions de vies ont été sauvées entre 2000 et 2014, grâce au diagnostic et au traitement de la tuberculose.

Situation épidémiologique au Maroc

Selon les estimations de l'OMS pour l'année 2014, le nombre annuel de cas incidents de la tuberculose au Maroc était d'environ 36 .000.

En 2015, un total de 30.636 cas de tuberculose, toutes formes confondues (28.955 nouveaux cas et 1.681 cas de rechutes), a été notifié, soit une incidence de 89 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de décès par TB était de 656 cas.

En 2015, 160 patients ont développé une TB-Multirésistante.

Entre 2000 et 2015, l'incidence globale a régressé de 17% et celle de la forme pulmonaire à frottis positif a régressé de 20% (Figure 1).




Figure 1. Evolution du nombre de cas et de l'incidence de TB au Maroc, 2000-2015 (Nouveaux cas et cas de rechutes).

La proportion de la forme extra-pulmonaire (TEP) était la plus élevée en 2015, avec 52% des cas (dont 3% étaient des cas de primo-infection tuberculose), contre 48% des cas de tuberculose pulmonaire.

Les cas de TB confirmés bactériologiquement en 2015 ont représenté 44% des cas notifiés, contre 56% des cas diagnostiqués selon des critères cliniques.

La distribution selon l'âge révèle que près des 2/3 des cas étaient des adultes jeunes, d'âge compris entre 15 et 44 ans.

60% des cas enregistrés concernaient des hommes (Figure 2).




Figure 2. Répartition des cas de TB selon le sexe et l'âge au Maroc, 2015

La distribution géographique révèle que 5 régions ont totalisé, à elles seules, 58 % des cas de tuberculose notifiés, avec une incidence dépassant la moyenne nationale. Ces régions étaient représentées par le Grand Casablanca, Tanger-Tétouan, Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, Gharb-Chrarda-Beni-Hssen et Fès-Boulemane (Figure 4).

La maladie s'est concentré en milieu urbain et a affecté plus particulièrement les quartiers défavorisés des grandes villes.




Figure 3. Incidence de la TB toute forme par région au Maroc, 2015.

L'analyse des résultats du traitement de la cohorte des nouveaux cas enregistrés en 2014, a révélé les taux suivants :

- Un taux de succès thérapeutique de 86%
- Un taux de perdus de vue de 6%
- Un taux d'échec thérapeutique de 1%
- Un taux de létalité de 2%